

Processus	PR 01 - PRE ANALYTIQUE	Réf : 41-FP-PRE-71-013
Instruction	Recueil d'urines pour ECU	Version 7

Dans la mesure du possible, le recueil est fait au moins quatre heures après la dernière miction.

### 1) Recueil




Lavez-vous les mains. Puis procédez à une toilette intime minutieuse en suivant la procédure du laboratoire.



Dévissez le couvercle bleu ou jaune du pot de recueil. **Ne pas soulever l'étiquette**




Posez le couvercle, canule vers le haut. **Ne pas toucher la canule**



Urinez le premier jet dans le WC.



Poursuivez dans le pot.



Refermez le pot, en vissant complètement le couvercle.


### 2) Transfert en tube



Soulevez l'étiquette blanche et collez-la au bord du couvercle. **Transférez l'urine du pot vers les tubes dans les meilleurs délais.**



Insérez le tube en poussant à fond. Attendez la fin du remplissage avant de retirer le tube. **Ne pas ouvrir les tubes**



Homogénéisez le tube par 8 à 10 retournements lents (tube à bouchon kaki).



Remplacez l'étiquette sur l'orifice du couvercle.



Identifiez l'échantillon.



Ordre de prélèvement des tubes :

Respectez le niveau de remplissage minimum indiqué par un trait sur l'étiquette du tube kaki.

Ne pas oublier d'identifier les tubes. Déposer les tubes à **température ambiante** au laboratoire dans les **2h maximum** suivant le recueil. En cas d'impossibilité, conserver les tubes au réfrigérateur **pendant 12h maximum**.

Nom : ..... Prénom : .....

Date de naissance : ..... / ..... / .....

Date du prélèvement : ..... / ..... / .....

Heure de percutage des tubes : ..... h .....

Les urines ont-elles été mises au frigo ?  Oui  Non

#### 1) Modalités de recueil:

- Urines de 1er jet
- Urines de milieu de jet
- Porteur de sonde urinaire à demeure, JJ... Préciser : .....
- Stomie (cocher si OUI) type :

#### 2) Contexte:

- Grossesse
- Suspicion d'infection

Traitement antibiotique :  En cours  Après traitement  Prévu

Préciser la date : ...../...../..... et l'antibiotique : .....

- Contrôle après traitement
- Bilan préopératoire
- Bilan postopératoire
- Bandelette Urinaire positive
- Autres (préciser) : .....

#### 3) Signes cliniques:

- Absence de symptômes
- Brûlures en urinant.
- Envie d'uriner plus fréquente
- Fièvre
- Incontinence (perte urinaire)
- Hématurie (Sang dans les urines)  Douleurs lombaires
- Autres (préciser) : .....

Prélèvement

Renseignements