

Processus	PR 01 - PRE ANALYTIQUE	Réf : 41-FP-PRE-71-039
Instruction	Fiche pour prélèvement Vaginal	Version 2

PV

Préconisations pour le prélèvement :

S'abstenir de toilette ou de rapport sexuel dans les 24h précédentes. Eviter la période des règles.

Prélever sous spéculum, sans lubrifiant

- Après mise en place du spéculum, réaliser le prélèvement par écouvillonnage des parois vaginales.
- Après le prélèvement, enfoncer l'écouvillon dans la gélose de conservation et préciser le nom, prénom, date de naissance et l'origine du prélèvement
- Procéder de la même manière pour un deuxième écouvillon au niveau de la paroi vaginale et au niveau du col
- Compléter la fiche de suivi laboratoire et les renseignements cliniques.

Synthèse : Prélèvement de 1 écouvillon sec et 1 écouvillon gélosé au niveau de la paroi vaginale et du col

Rem : Pour la recherche de chlamydiae, mycoplasme genitalium suivre le protocole spécifique CERBA (milieu de transport spécifique)

Pour la recherche d'herpès, orienter le patient vers le laboratoire (milieux spéciaux)

Réf : 41-FP-PRE-71-039 V2

Contexte analytique

Prise d'ATB : OUI (Préciser :)
 NON

Présence d'un stérilet : OUI NON

Grossesse : OUI (Date de grossesse :)
 NON

Présence de signes cliniques : OUI NON

Si oui préciser : pertes brûlures Autres.....

Si non préciser le contexte de la demande :

- bilan d'IST
- contrôle après frottis
- contrôle après traitement
- recherche portage Strepto B (prélever 1 seul écouvillon gélosé)
- Autres :

Examen clinique

Leucorrhées : OUI NON

Si oui préciser : Abondante Peu abondante

Couleur :

Lésions : OUI NON

Si oui préciser : érythème ulcération vésicules

Préciser le niveau :

Aspect du col : sain ectropion

Autre lésion :